


第13回



目の健康講座

ウェブ座談会

目をいたわっていますか？ いまは見えるのが当たり前でも、高齢になると体力和同様に目も衰えます。人生100年時代が近づく中、人生の最期まで「見える暮らし」を続けるために、眼科医は「40歳を過ぎたら目の健康診断を」と呼びかけています。6月27日に大阪府眼科医会が開いた「第13回 目の健康講座」は、目の病気の早期発見と早期治療がテーマ。新型コロナウイルス感染症予防のため、ウェブ座談会形式で中高年代から増える目の病気を解説してもらいました。【安部拓輝】

健康づくりの一助に



大阪府眼科医会 佐堀彰彦会長

今年で13回を迎えた「目の健康講座」は新型コロナウイルス感染症予防のため、心なな講演会を中止し、学術担当理事の先任方によるウェブ座談会を実施しました。「中高年の目の病気」がテーマですが、新型コロナウイルスの病気の関わりについて触れていきます。皆様の目の健康にも役立ていただければ幸いです。

「第13回 目の健康講座」は、ウェブ座談会形式で実施された



大阪府眼科医会 同 学術担当理事
 坂口裕和副会長
 今本量久医師、丸山耕一医師、宮澤裕之医師、城信雄医師、山田晴彦医師(司会)

新型コロナウイルス マスク・手洗いで感染予防

新型コロナウイルスの病気の関わりについて触れていただきます。皆様の目の健康にも役立ていただければ幸いです。

網膜剥離

症状あればすぐに受診を

網膜剥離は、発症すると手術が必要な病気です。坂口 網膜は眼球の後ろにあり、光を受取る神経の膜です。網膜に穴や裂け目が生じ、別がれる病気が裂孔性網膜剥離です。発症すると入院して手術が必要になることが多いです。前触れとしては、視野に虫みいたいなものや飛んで見えたり(飛蚊症)、暗い場所ばかり目や閃光のような光を感じることもあります。光視症。

坂口 網膜剥離は、発症すると手術が必要な病気です。坂口 網膜は眼球の後ろにあり、光を受取る神経の膜です。網膜に穴や裂け目が生じ、別がれる病気が裂孔性網膜剥離です。発症すると入院して手術が必要になることが多いです。前触れとしては、視野に虫みいたいなものや飛んで見えたり(飛蚊症)、暗い場所ばかり目や閃光のような光を感じることもあります。光視症。

網膜剥離は、発症すると手術が必要な病気です。坂口 網膜は眼球の後ろにあり、光を受取る神経の膜です。網膜に穴や裂け目が生じ、別がれる病気が裂孔性網膜剥離です。発症すると入院して手術が必要になることが多いです。前触れとしては、視野に虫みいたいなものや飛んで見えたり(飛蚊症)、暗い場所ばかり目や閃光のような光を感じることもあります。光視症。

加齢黄斑変性

視力維持しうる療法普及

加齢黄斑変性は、加齢によって網膜の中心にある黄斑部が悪くなる病気です。黄斑部に新生血管という悪い血管が生え、視野の中心が見えなくなることがあります。欧米発症率が、後天的失明トップを占めています。日本では第4位ですが、徐々にその割合が上がっています。不明な点も多いですが、

加齢黄斑変性は、加齢によって網膜の中心にある黄斑部が悪くなる病気です。黄斑部に新生血管という悪い血管が生え、視野の中心が見えなくなることがあります。欧米発症率が、後天的失明トップを占めています。日本では第4位ですが、徐々にその割合が上がっています。不明な点も多いですが、

主催 大阪府眼科医会 後援 大阪府、大阪市、大阪府医師会、毎日新聞社

本でもたくさん行われていま

が必要になります。

白内障の手術治療は日

目

網膜
硝子体
水晶体
瞳孔
角膜
虹彩
毛様体
脈絡膜
黄斑
視神経

大阪府眼科医会が主催している公開講座や相談会で質問が圧倒的に多いのが白内障です。目の中の水晶体が高くなるのが原因で、主に加齢とともに起こってくる病気です。症状としては、目がかすむ、まぶし目が開けづら、眼鏡をかけてもスッキリ見えない、などがあります。治療するには水晶体を替えて人工レンズを入れる手術が必要になります。

白内障 局所麻酔で手術負担軽減

今本 現在は国内で年間約14万件の手術が行われていて、以前よりも医療技術が進歩し、局所麻酔身体に負担少ない手術受けられるようになってきました。日本の場合、人工レンズはほとんどが単焦点レンズで、健康保険が適用できます。自己負担が少なくて済みますが、見る距離によって眼鏡が必要です。これに対し多焦点レンズは眼鏡なしでも遠くも近くも見えますが、健康保険が適用できません。自己負担が少なくて済みませんが、見る距離によって眼鏡が必要です。これに対し多焦点レンズは眼鏡なしでも遠くも近くも見えますが、健康保険が適用できません。

緑内障 40歳過ぎたら眼底検査を

丸山 緑内障は、失明の原因の一つで、発症すると視野が狭くなる病気です。初期は自覚症状がありません。丸山 緑内障は、失明の原因の一つで、発症すると視野が狭くなる病気です。初期は自覚症状がありません。丸山 緑内障は、失明の原因の一つで、発症すると視野が狭くなる病気です。初期は自覚症状がありません。

糖尿病網膜症 血糖値の抑制で予防可能

宮澤 糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、血糖値が高くなることで発症する病気です。宮澤 糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、血糖値が高くなることで発症する病気です。宮澤 糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、血糖値が高くなることで発症する病気です。宮澤 糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、血糖値が高くなることで発症する病気です。



坂口裕和医師 山田晴彦医師 宮澤裕之医師